


Yngre



Frysa dina äggceller?

Information om hur det går till att ta
ut en bit av en äggstock och frysa in.

Innehållsförteckning

Varför ska jag frysa in mina ägg?

Hur går det till?

Hur tas en bit av äggstocken ut?

Vad händer sen?

Mer information?




Varför ska jag frysa in mina ägg?

Du ska nu få en behandling för din sjukdom som hjälper dig att bli frisk.

Behandlingen kan förstöra dina ägg. Då kan det bli svårt att få barn när du blir vuxen.

Det går att frysa in och spara dina ägg innan behandlingen. Då kan du använda dem senare i livet. Äggen förvaras i en speciell frys på sjukhuset.

Det är inte säkert att du kan få barn senare med hjälp av dina frysta ägg. Men genom att frysa in dem har du en större chans att kunna få barn med dina egna ägg än om du inte gör det.




Förstorad bild av ena äggstocken och var äggcellerna befinner sig i de olika mognadsstadierna.

Hur går det till?

Äggen finns i äggstockarna i nedre delen av magen. Alla ägg finns där redan när du föds, men är inte mogna. När du får din första mens betyder det att äggen har börjat mogna. Ägg som börjat mogna kan tas ut och frysas in, men först behövs ett par veckors behandling med hormoner.

Om du inte har fått mens, eller om du behöver starta din behandling genast och inte hinner få hormonbehandling, kan en bit av din äggstock eller hela äggstocken istället tas ut och sparas. I äggstocken finns omogna ägg. När du blir vuxen kan den lilla biten av äggstock sättas tillbaka igen och då kan äggen mogna.

Att ta ut en äggstock eller bit av en äggstock är inte farligt och det gör inte ont. Men det kan kännas jobbigt för dig ändå. Om du är orolig och tycker att det verkar obehagligt så säg det. Läkare och annan personal kommer att förklara och hjälpa dig så mycket de kan. Om du berättar ifall något känns konstigt så förstår personalen bättre hur de kan hjälpa dig.



Hur tas en bit av äggstocken ut?

Du kommer att vara sövd och inte känna något. En liten bit av din äggstock tas ut genom en operation som kallas för titthålsoperation. Läkaren för in en tunn nål och tar ut en bit av äggstocken.

Efter operationen vaknar du och får stanna en stund på sjukhuset tills du känner dig pigg igen. Någon vuxen kan vara hos dig både när du blir sövd och när du vaknar. Om du mår illa eller har ont efter operationen kan du få medicin mot det.

Vårdpersonalen ser till att biten av din äggstock förvaras i en frys på sjukhuset. Där ligger den tills du blir vuxen och vill använda den för att försöka få barn.

Vad händer sen?

När du är vuxen och vill försöka få barn får du träffa en läkare igen och prata om hur möjligheterna ser ut att använda dina ägg i frysen. Det är inte helt säkert att de går att använda. Det kan också vara så att du har ägg i din äggstock som inte har blivit förstörda av behandlingen. Läkaren undersöker dig och dina ägg och förklarar hur dina möjligheter ser ut.

Om du har en bit av äggstock i frysen kommer den att sättas tillbaka i din kropp igen genom en operation. När äggen har mognat kan de bli befruktade. Oftast görs det genom en provrörsbefruktning.

Det finns andra sätt att bli förälder på än med sina egna ägg. Man kan till exempel adoptera barn eller få ägg från någon annan, en äggdonation.

Mer information?

Det finns en film riktad till unga som ska spara sina ägg. Den går att se på **www.vavnad.se** under rubriken **Könsceller**.

På **www.1177.se** finns information om cancer, om fertilitet vid cancerbehandling och om behandlingar vid ofrivillig barnlöshet.

Anteckningar



Broschyren är framtagen av vävnadsrådets arbetsgrupp UNGA Vävnadsrådet, Nationella rådet för organ, vävnader, celler och blod, är ett rådgivande forum inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och verkar för nationell samordning och enhetliga rutiner inom området.

